

oraqix®
 GEL PERIODONTAL Lidocaïne
 Prilocaine
 2.5%/2.5%



Indication

Oraqix® est indiqué pour les adultes devant recevoir une anesthésie pendant les procédures de détartrage et/ou de surfaçage radiculaire.

Caractéristiques du produit

C'est un gel anesthésiant local, appliqué en sous-gingival, consistant en un mélange eutectique de lidocaïne et de prilocaïne, dans un nouveau système thermosensible. Oraqix s'applique comme un liquide, puis devient un gel dans la poche parodontale.

- Application sans aiguille, sans injection
- 30 secondes de latence
- L'effet anesthésique dure environ 20 minutes (écart individuel 14-31 minutes)
- Flexibilité - traitement d'une dent, d'un quadrant ou de toute une bouche
- Peut être réappliqué, si nécessaire, avec une dose maximale de 5 cartouches (8.5 gr de gel)
- Oraqix se conserve à température ambiante

Contre-indications

- Oraqix est contre-indiqué chez les patients qui présentent un historique d'hypersensibilité aux anesthésiques de type amide ou à tout autre composant du produit.
- Oraqix ne peut pas être injecté.

Réactions indésirables

Les réactions indésirables les plus fréquemment rencontrées dans les études cliniques ont été des réactions au site d'application, des maux de tête et des altérations du goût.



Cela vous intéresse?

Appelez DENTA au 03 450 93 20

anesthésie sans aiguille

Les études cliniques démontrent qu'Oraqix® est efficace pour soulager la douleur pendant les procédures de détartrage et de surfaçage radiculaire^{2,3,4}.

Une technique qui apporte au patient un maximum de confort



Appliquer Oraqix sur le bord gingival de la dent sélectionnée à l'aide de l'embout mousse. Attendre 30 secondes.



Puis remplir la poche avec du gel jusqu'à ce qu'il devienne visible à la limite gingivale. Après 30 secondes le traitement peut être commencé. Un temps d'attente plus long n'augmente pas l'effet anesthésique.



L'effet anesthésiant, évalué lors du sondage de poches, a une durée approximative de 20 minutes.

L'applicateur Oraqix®

- L'applicateur Oraqix® est indiqué pour l'administration d'Oraqix®
 Il est contre-indiqué pour l'usage des anesthésiques locaux injectables
- Facile à charger, l'applicateur Oraqix® permet une application efficace du gel dans les poches parodontales
- L'applicateur Oraqix peut être autoclavé après emploi

Préparation à l'usage



Technique de la double courbure

Emballage

Les cartouches d'Oraqix sont emballées individuellement dans un emballage blister qui contient également un embout mousse. Chaque carton contient 20 cartouches et 20 embouts.

Consulter le RCP pour ce qui concerne Oraqix et le mode d'emploi de l'applicateur.

2. Van Steenberghe D., Bercy P., De Boever J., Adriaens L., Hendrickx E., Adriaenssens C., Rompen E., Malmenas M., Ramsberg J.: Patient Evaluation of a Novel Non-Injectable Anesthetic Gel: A Multicenter Crossover Study Comparing the Gel With Infiltration Anesthesia During Scaling and Root Planing. J Periodontol November 2004; 75:1471-1478.
 3. Magnusson I, Geurs N, Harris P, Hefti A, Mariotti A, Mauriello S, Soler L, Offenbacher S: Intrapocket Anesthesia for Scaling and Root Planing in Pain-Sensitive Patients. J Periodontol May 2003; 74: 597-602.
 4. Jeffcoat M, Geurs N, Magnusson I, MacNeil S, Mickels N, Roberts F, Robinson P, Salamati A, Yukna R: Intrapocket Anesthesia for Scaling and Root Planing: Results of a Double-Blind Multicenter Trial Using Lidocaine Prilocaine Dental Gel. J Periodontol July 2001; 72: 895-900.